

ABY ZAPEWNIĆ JAK NAJWIĘKSZĄ SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PODAWANYCH LEKÓW DO OCZU, NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO KILKU ZASAD:




1. Jeśli buteleczka posiada „kołnierzyk”, koniecznie usunąć go, aby w czasie podawania kropli nie spadł i nie uszkodził oka.
2. Krople wkraplać w części skroniowej dolnego załamka spojówkowego, z dala od mięsaka łzowego. W ten sposób zmniejszasz ryzyko przedostania się kropli do dróg łzowych!

**JEDNORAZOWO WKRAPLAJ
NIE WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ KROPLĘ LEKU.**



3. Zamknij powieki na 2 minuty i nie mrugaj (podczas mrugania lek może przedostać się do nosa, następnie przez bogato ukrwioną błonę śluzową bezpośrednio do krwioobiegu i działając jak zastrzyk dożylny – rozprzestrzenić się po całym organizmie).
4. Uciskaj delikatnie palcem okolice dolnego kanalika i woreczka łzowego przez 2 minuty. **Nie uciskaj oka!** Uciśnięcie oka może spowodować groźne w skutkach zwolnienie akcji serca (odruch oczno-sercowy).
5. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku leków, kolejny lek należy wkraplać nie wcześniej niż po 10 minutach.
6. U małych dzieci lek powinno wkraplać się przy pochyleniu główki w kierunku skroniowym, by nadmiar leku wypłynął. Po podaniu leku uciśnij na okolice dolnego kanalika i woreczka łzowego. **Nie uciskaj oka!**



PROSIMY O STOSOWANIE LEKÓW ZGODNIE Z ZALECENIAMI LEKARZA.



GPS 51° 47' 42'', 19° 21' 49''